

aus:
 Th. Paul, V. Pudiel:
 Bulimia nervosa
 Ernährungs-Umschau 32(3): 74-79(1985)
 Lit.Nr. 13.016

Brigitte-Aktion, Ende 1983
 N = 395 Bulimie-erfahrene Frauen

Symptomatik

Die durchschnittliche Erkrankungsdauer liegt bei sieben Jahren. Überwiegend beginnt die Symptomatik in einem Alter zwischen 14 und 20 Jahren. Das aktuelle Gewicht von 40% der Patienten liegt im Bereich des Normal- bzw. Idealgewichts; mehr als ein Drittel liegen aber noch darunter (Tab. 3). Adipöse Patienten lassen sich kaum finden (2%).

Tab. 3: Aktuelles Körpergewicht sowie anamnestische Gewichtsdaten, bezogen auf das Broca-Referenzgewicht. Das „Wunschgewicht“ ist jenes Körpergewicht, welches von den Patientinnen als erstrebenswertes Zielgewicht genannt wurde.

	unter – 30% Broca- Ref.-Gew.	– 30% bis – 20% Broca- Ref.-Gew.	– 20% bis – 10% Broca- Ref.-Gew.	– 10% bis + 10% Broca- Ref.-Gew.	10% bis 20% Broca- Ref.-Gew.	20% und mehr Broca- Ref.-Gew.
aktuelles Gewicht	0%	22,7%	44,2%	29,0%	2,2%	1,9%
maximales Gewicht	0%	3,6%	25,4%	53,2%	11,0%	6,8%
minimales Gewicht	23,6%	40,4%	28,5%	7,5%	0%	0%
Wunschgewicht	6,1%	45,4%	40,4%	7,9%	0,2%	0%