

## Ernährungsabhängige Erkrankungen in Deutschland im Vergleich

Krankheit (-risiko)	Kosten (1) (in MRD DM/Jahr)	Bevölkerungsanteil, der davon betroffen ist	Beurteilung durch die Bevölkerung (2) "am kosten-trächtigtsten"	Anteil in ernährungsbezogenen Zeitungsartikeln (3) (3a)
Herz-Kreislauf-Erkrankungen	33	50% aller Todesursachen	68%	2,0% (13,8%)
Übergewicht	0,7/8-12 (4)	30-40% (bzw. bei BMI >30%): 10-20%	22%	1,2% (10,5%)
Karies	20	15 Millionen	38%	0,4% (3,1%)
bösartige Neubildungen (Krebs)	10	25% aller Todesursachen	71%	1,6% (11,5%)
Alkoholismus	3-4/35 (5)	3 Millionen	33%	0,1% (0,7%)
Struma (Jodmangel)	1-2	10 Millionen (13-15%)	2,5%	0,7% (5,0%)

(1) Ernährungsabhängige Krankheiten und ihre Kosten. Band 27, Schriftenreihe des Bundesministeriums für Gesundheit; Bonn, 1993 / DGE: Ernährungsbericht 1996

(2) Umfrage des IÖS der BFE im November 1994

(3) Studie des IÖS der BFE: Darstellung des Themas Ernährung in deutschen Zeitungen (3) bezogen auf alle Artikel (3a) bezogen auf Artikel der Kategorie "ernährungsabhängige Erkrankungen (Anteil 14,2% = 3413 Artikel)

(4) Schneider, R.: Relevanz und Kosten der Adipositas in Deutschland. Ernährungs-Umschau 43(10) 369-374 (1996)

(5) Küpper, C.: Alkoholmißbrauch und seine Folgen. aid Verbraucherdienst 41(6) 124-126 (1996)

(OLTERS DORF/IÖS/4-4-97)